

EN CAS DE RUPTURE DE LA CHAÎNE DU FROID

Nom du Médicament	CAT en cas de rupture de la chaîne du froid
ACTOSOLV	Sera conservé à température ambiante et injecté dans la semaine (stable 1 semaine à 25°).
ARANESP	Si plus de 2 heures à plus de 8°, ne pas remettre au froid, Conserver à température ambiante et injecter dans la semaine (7 jours à 25°), Si moins de 2 heures à plus de 8°, peut être remis au frais et injecté.
GLUCAGEN	Ne pas remettre au froid, peut rester à température ambiante 18 mois.
ISUPREL	Ne pas remettre au froid, se conserve 3 mois à une température inférieure à 25°, à l'abri de la lumière dans son emballage. À utiliser dans les 3 mois.
LEVOFOLINATE DE CALCIUM	Ne pas remettre au froid, stable un mois à température inférieure à 25°, à utiliser dans le mois.
MIRCERA	Ne pas remettre au frais, conserver à une température ambiante inférieure à 30° pendant un mois maximum peut être injecté dans le mois.
NEORECORMON	Peut subir une rupture de la chaîne du froid, noter sur le boîte « rupture de la chaîne du froid le ../ ../ » Peut rester 3 jours à une température inférieure à 25°, remettre au froid, Ne pas utiliser en cas de deuxième rupture de la chaîne du froid.
NOVORAPID	Se conserve 4 semaines à température ambiante mais dans son emballage à l'abri de la lumière.
PARSABIV	Ne pas remettre au froid, stable 7 jours à température ambiante dans son emballage à l'abri de la lumière, Sinon stable 4 heures sans son emballage mais à l'abri des rayons du soleil.
VACCINS	Au cas par cas : Influvac stable 24h à température ambiante, peut être remis au froid, Engerix B à détruire.
YDRALBUM (albumine)	Peut rester à température ambiante.