

	PRISE EN CHARGE DE L'URGENCE VITALE INOPINEE (Malades, Visiteurs, Personnels) AUBENAS	
Conduite à tenir	CAT OPC URG 009	Version 3
Siège social : 31 Boulevard des Alpes CS 30029 – 38242 MEYLAN CEDEX - Tél. : 04 38 38 01 38		1/1

Ne réagit pas, mais RESPIRE EFFICACEMENT

- PLS (mise sur le côté).
- Surveiller : respiration + pouls.
 - Stimuler sa conscience.



Ne réagit pas, NE RESPIRE PAS

Effectuer : 30 compressions thoraciques et insuffler 2 fois.



ou



- Continuer l'alternance de 30 massages / 2 insufflations en ajoutant de l'O₂ à l'insufflateur manuel (BAVU) : 15 L/min.
- Mettre en place le défibrillateur semi automatique.

S'étouffe

- 5 claques vigoureuses dans le dos puis 5 compressions abdominales.
- Ou manœuvre de HEIMLICH.

Est en Collapsus (hémorragie, choc...)

- La victime réagit, elle est pâle, a soif, son pouls radial est absent ou mal perçu.
- Compression manuelle si hémorragie.
- Position plat dos, membres inférieurs relevés.
- O₂ masque à haute concentration : 15 L/min.
- Voie veineuse périphérique : cathéter court de bon calibre.

Dans tous les cas, libérer les voies aériennes :

Basculer la tête en arrière et desserrer rapidement tout ce qui peut gêner la respiration

APPORTER LE CHARIOT D'URGENCE

Prévenir le médecin du service

Alerter ou faire alerter le



15

- S'identifier,
- Se localiser précisément
- Décrire brièvement la situation

Donner le **bilan** :

- Conscience (réaction)
- Respiration
- Présence d'un pouls radial/TA

Pour les personnels autorisés

- ① Préparer une aspiration efficace
- ② Mettre en place une voie veineuse de bon calibre avec sérum physiologique
- ③ Préparer le matériel d'intubation trachéale
- ④ Préparer les drogues d'urgence (adrénaline...)
- ⑤ Prévoir 2 pousse-seringues électriques